



**El día antes y el día de la cirugía o procedimiento
Una guía para los medicamentos contra la diabetes**

1. Encuentre los medicamentos recetados en esta página y siga esas instrucciones a menos que su médico para la diabetes le indique otra cosa.
2. Controle el nivel de azúcar en sangre antes de las comidas y de acostarse al menos 2 días antes del procedimiento o la cirugía (si controla con mayor frecuencia, siga la rutina). Llame al médico si el nivel de azúcar en sangre es mayor de 150 en dos ocasiones.
3. Las tabletas combinadas **no** aparecen en la lista a continuación. Si una tableta combina dos medicamentos y uno de los medicamentos está listado como “**no tomar**” o “**suspender**”, **no tome la tableta combinada**.
4. Si está embarazada, siga las instrucciones de su médico para la diabetes.

EL <u>DÍA ANTES</u> DE LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO	EL <u>DÍA DE</u> LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO
<p><u>Puede tomar los siguientes medicamentos</u></p> <p>Actos (Pioglitazona) Amaryl (Glimiperida) Avandia (Rosiglitazona) Byetta (Exenatida) Glucophage, y otros (Metformina) Con función renal normal – tomar como es habitual Glucophage, y otros (Metformina) – Si se desconoce la función renal o está disminuida – suspender 48 horas antes de la cirugía o procedimiento Glucotrol (Glipizida) Januvia (Sitagliptina) Micronase, Diabeta, y otros (Gliburida) Prandin (Repaglinida) Starlix (Nateglinida) Symlin (Pramlintida)</p>	<p><u>No tome estos medicamentos por la mañana</u></p> <p>Amaryl (Glimiperida) Glucophage, y otros (Metformina) – Averigüe con su médico cuándo reiniciar. Glucotrol (Glipizida) Micronase, Diabeta, y otros (Gliburida) ***** <u>No tome los medicamentos que se indican a continuación por la mañana, pero puede volver a tomarlos después de la cirugía o procedimiento</u> Avandia (Rosiglitazona) Actos (Pioglitazona) Byetta (Exenatida) Januvia (Sitagliptina) Prandin (Repaglinida) Symlin (Pramlintida) Starlix (Nateglinida)</p>
<p>INSULINA <u>EL DÍA/LA NOCHE ANTES</u> DE LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO</p>	<p>INSULINA la <u>MAÑANA</u> DE LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO</p>
<p>La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) puede requerir una dosis más baja de insulina al acostarse. Por favor pregúntele a su médico para la diabetes.</p> <p>Tome la insulina indicada a continuación de la forma habitual (Si tiene T1DM, vea arriba): Apidra, Humalog, Novolog, Lantus, Levemir, NPH, insulina regular, 70/30, 75/25, y 50/50.</p>	<p>La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) puede requerir una dosis más baja de insulina por la mañana. Por favor pregúntele a su médico para la diabetes.</p> <p>Con diabetes mellitus tipo 2 tome una dosis completa de Lantus o Levemir. Pregúntele a su médico para la diabetes la dosis de NPH, insulina 70/30, 75/25, ó 50/50. No tome Apidra, Humalog, Novolog, ni insulina regular.</p> <p align="center">INSULINA <u>DESPUÉS</u> DE LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO</p> <p>Reiniciar cuando ingiera una dieta normal: Apidra, Humalog, Novolog, o insulina regular. Tomar de la forma habitual: Lantus, Levemir, NPH por la tarde después de la cirugía o procedimiento.</p>

Firma del médico

Fecha